

RESEÑA DE LA SESIÓN GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL  
DÍA 12 DE ABRIL DE 1898

*(Caso de Astragatomia, por el Dr. Recasens, con presentación de enfermo. Interviene el Dr. Comet. Rectifica el Dr. Recasens.—Concluye el Dr. Ferrer Morer el desarrollo del tema «Consideraciones sobre la retención de la bujía en la uretrotomía interna.» Interviene el Dr. Valls (D. Mateo). Rectifica el Dr. Ferrer.)*

Se abrió la sesión á las nueve y media de la noche bajo la presidencia del Dr. Recasens.

Leída el acta de la anterior, fué aprobada.

Pasó á ocupar la presidencia el Dr. Golferichs para poder el Dr. Recasens disertar sobre un caso de astragatomía, con presentación de enfermo. Dicha operación la practicó el Dr. Recasens, siguiendo las prácticas de Ollier, como primer tiempo de la resección tibio-tarsiana. Once casos lleva operados en esta forma, habiendo obtenido en todos excelente resultado. Extirpando el astrágalo, queda un gran espacio por el que se pueden atacar cómodamente las fungosidades de la articulación y la mortaja tibio-peronea. Por este procedimiento se dejan íntegros los dos maléolos y se forma una nueva articulación, gracias á la que queda poca ó nula claudicación ulterior. La cara superior del calcáneo llega á encajar perfectamente con los dos maléolos, viene una nueva producción de tejido fibroso y se constituye una nueva artrosis en muy buenas condiciones. Con los antiguos procedimientos, aunque los resultados inmediatos eran buenos, se producía muchas veces á la larga el pie varus, llegando hasta ulcerarse el dorso del pie, como pudo observar en algún caso.

En los niños, la tuberculosis ósea es curable por sí sola, y cuando está localizada en esta articulación no hay duda que con revulsivos, quietud y vendajes inamovibles puede llegarse á un buen resultado. Pero en casos muy intensos es necesaria una intervención más activa.

En el caso presente se trataba de una niña de cuatro ó cinco meses, con la articulación muy abultada, cojera doble, fungosidades y los demás síntomas característicos de esta artritis. Con puntos de fuego y la inamovilidad, no obtuvo ningún resultado, decidiéndose á operarla. Usó el procedimiento Ollier, que en síntesis es el siguiente: 1.º Se prac-