

lencias ejercidas directamente sobre el ojo; la pérdida del nuevo humor acuoso, la inversión del colgajo y la hernia doble del vítreo é iris. La primera debida á un movimiento del ojo al practicar un reconocimiento se conoce por el contacto del iris con la córnea en toda su extensión siendo invisible á simple vista el pequeño trayecto microscópico por donde se escapó el líquido y careciendo de importancia esta complicación. Teóricamente debería exponer á la infección pero no se presenta en estas circunstancias; la supuración tardía empieza por la cámara anterior é iris cuando la herida está cicatrizada y la cámara del todo llena de humor acuoso. La inversión del colgajo se produce en personas inquietas que abren el ojo y al cerrarlo el borde palpebral superior se lleva consigo el colgajo corneal mal adaptado. La hernia del humor vítreo y del iris reconoce por causa un golpe recibido en el ojo y es sumamente rara. Puede presentarse también, poco después de la extracción, la hemorragia del fondo del ojo motivada por la falta de presión intraocular en un arterio-esclerósico, complicación funesta que vacía el ojo.

Conocido el mecanismo de las complicaciones más frecuentes admitimos como precauciones necesarias la oclusión del ojo por medio de un vendaje y la posición horizontal del operado durante los primeros días. Una compresión suave y uniforme manteniendo el colgajo en posición facilita la cicatrización y evita la hernia así como la favorece cuando comprime fuerte y desigualmente. No debemos extremar el rigor obligando á los ancianos á guardar el decúbito dorsal; cualquiera posición es buena con tal de no comprimir ni violentar directamente la región operada. Es preciso vigilar al operado una ó dos noches y tal vez provocar el sueño tranquilo por medio del cloral ó del bromuro potásico y alimentarle con substancias de fácil digestión y blandas en cantidad proporcionada al estado del aparato digestivo y la emoción mayor ó menor que experimentó por la operación respetando el apetito y costumbres de nuestro operado en todo cuanto se refiere á la ingesta. Aunque acostumbremos hacer guardar cama durante