

Laboratorios ROBERT & CARRIÈRE - Paris

STANNOXYL

a base de estaño, exento de plomo, para el tratamiento de las FORUNCULOSIS comprimidos, pomada, líquido, ampollas

iodo BISMUTO ERCÉ

0'02 - 0'04 - 0'08

GLUCO-914 (intramuscular)

0'05 - 0'10 - 0'15 - 0'20 - 0'25 - 0'30 - 0'40 - 0'50 - 0'60

ACEITE GRIS ERCÉ

0'04 - 0'08 - 0'10

para el tratamiento de la SIFILIS indoloras, en ampolla-geringa

LITERATURA Y MUESTRAS:

M. SOLER ELÍAS Riera S. Miguel, 25 BARCELONA


PIPERACINA MIDY

GRANULADA
EFLERVESCENTE

"El más rico en principio activo."

Especificar bien el nombre MIDY para evitar las substituciones

Solubilidad comparada del Acido Úrico en:



2 o 4 Cucharadas de las de café por día.

MUESTRA LABORATORIOS MIDY
9, Rue de Camille Rivière.
PARIS

Anemia
Escrotula
Clorosis
Linfatismo

"Calciline"

Comprimidos 2 Formas: Granulado

3 Tipos:

Calciline - Calciline Adrenalina - Calciline Metilarsinato

Tuberculosis pulmonar
oste y ganglionar

"Néo-Calciline"

OPOTERAPIA TOTAL

asegura la penetracion integral del Ion Calcico por la via intestinal.

2 comprimidos, 2 sellos o 2 medidas (granulado) antes de cada comida, 20 días por mes. Niños 1/2 dosis.

Crecimiento
Adenitis
Coxalgia
Infermedades de los huesos

Formula "NEO-CALCILINE":

HUESO FRESCO EPIFISARIO	0,15
PARA-TIROIDE	.. 0,051	KINASA..... 0,05
TIMO	... 0,05	EREPSINA..... 0,05
SUPRARENAL	... 0,05	DIASTASA..... 0,05

para 1 Comprimido, 1 sello o 1 medida.

Diabetes
Caries Dental
Exceso de trabajo
Convalecencia

ODINOT, Ph¹⁸⁸⁸

PARIS

21, Rue Vinle¹⁸⁸⁸