


PIPERACINA MIDY

GRANULADA
EFTERVESCENTE

"El más rico en principio activo."

Especificar bien el nombre MIDY para evitar las substituciones

Solubilidad comparada del Ácido Úrico en:



2 a 4 Cucharadas de las de café por día.

EXHIBITORES: LABORATORIOS MIDY
9, Rue de Camille Rémont,
PARIS

MORRHUËTINE JUNGKEN

EL TÓNICO DE LA INFANCIA

SUCEDANEO SINTÉTICO DEL ACEITE DE HIGADO DE BACALAO AL QUE NO CONTIENE NI EN EXTRACTO

FÓRMULA Yodo metálico activo 0.015 gr. - Hipofosfitos con puentes Q15 id - Fosfato Sódico 0.15 id - Vehículo Glicerina Pura

LICOR NO AZUCARADO NI ALCOHÓLICO
SABOR GRATÍSIMO

LOS NIÑOS Y LOS ENFERMOS DE PALADAR DIFÍCIL LO TOMAN CON PLACER
TOLERADO PERFECTAMENTE

ADENOPATIAS RAQUITISMO
LINFATISMO ESCRÓFULA
ESTADOS LLAMADOS PRETUBERCULOSOS
DIABETES, HEREDOSIFILIS
AMENORREA, DISMENORREA
DEBILIDAD GENERAL
CONVALENCIAS, ETC ETC

LABORATORIO MIRABENT BARCELONA

KALOGEN

A BASE DE CLORURO, BROMURO Y YODURO DE CALCIO PURO

Obtenido por un procedimiento especial que asegura una perfecta estabilidad y una rápida asimilación de la Sal cálcica

INDICACIONES

Raquitismo en sus diferentes manifestaciones y en todos los casos que con venga una acción recalcitante rápida y enérgica

Muestras y Literatura: Dr. TAYA y Dr. BOPILL - Plaza San Agustín Viejo, 12
BARCELONA

Arrenoglicol

Granulado

Injectable

BACILACTEL

Comprimido y líquido

Laboratorio: J. Vintrolé - Guardiola
San Andrés, 125 - Lengua d'Oc, 2
BARCELONA

Muestras a disposición de los señores médicos