

sió de les normes profilàctiques per evitar aquesta malaltia (ja ens en ocuparem en un altre article), però és utilíssim també i necessari per la Societat guarir bé i definitivament els que ja estan malalts.

Hem dit en començar aquest article que tractar una blennorràgia no vol dir fer coses sense to ni so. En intentar tractar aquesta afecció tant es pot pecar per excés com per defecte. Avui ja ningú no aconseillarà deixar passar dies i esperar que la supuració sigui abundant per tractar-la, això, com diu el gran mestre francès Janet, és igual que esperar que un incendi prengui increment per començar la seva extinció.

Moltes vegades es peca, al contrari, per excés, usant sense moderació per al rentat de la uretra inflamada substàncies irritants a concentracions absurdes; procedint així, es malmet la mucosa que recobreix la uretra i s'augmenta per acció química la seva inflamació i la priva de les seves defenses naturals, les quals en lloc d'ésser ajudades pel tractament, son impossibilitades d'actuar i inutilitzades per la brutalitat del rentat. Aquest rentat, fet sense cap tècnica ni cap guia, sovint pel mateix pacient, no té altre efecte que facilitar la propagació de la infecció de la part anterior de la uretra a la uretra posterior i facilitar la penetració del microbi en la profunditat de les parets uretrals i aparèixer lesions sovint rebels de la pròstata, *prostatitis i abcés de la pròstata*, i altres localitzacions del gonococ que, com l'*orquitis*, són demostració de l'extensió en superfície i en profunditat de la infecció. ¡Quantes desgràcies pot produir una solució medicamentosa inadequada introduïda pel mateix malat en la uretra sense cap regla i mitjançant una petita xeringa!

Una altra cosa que soLEN fer els malalts és limitar-se a prendre pel seu compte tals o quals pildores o catxets (tots a base de substàncies anomenades balsamiques), que rapidament i temporalment assequen la supuració i donen una sensació apparent de guarició, però que no impedeixen la penetració del germen a les capes profundes de la uretra ni la constitució de les lesions de la blennorràgia crònica.

En la lluita individual contra la blennorràgia la bondat dels resultats obtinguts depèn, a part de condicions individuals (temperament, constitució, debilitat general, etc.) del pacient, de la bondat del tractament emprat i d'una bona direcció d'aquest tractament. Per tant, cal fugir, si no volem empitjorar el mal ja adquirit, de tota terapèutica que no estigui basada en un perfecte estudi de la malaltia i del malalt en cada cas determinat, això és, cal fer en cada cas un tractament racional de la blennorràgia aguda.

Conducta a seguir ante un traumático por el Dr. J. Florez Toro

(De la pàg. 15)

Cuando se trata de una fractura abierta, que por este mismo carácter tiene una mayor gravedad, estos primeros cuidados no son sólo necesarios, sino que se hacen indispensables, al igual que el traslado inmediato del lesionado a un lugar apropiado donde un cirujano pueda practicar la cura dentro de las primeras ocho horas. En este tipo de fracturas, la curación corre pareja a la prontitud con que se efectúa la primera cura. Si ésta puede hacerse antes de transcurrir las ocho primeras horas, tiempo máximo de latencia de los gérmenes que infectan necesariamente a toda herida, se beneficia enormemente al lesionado. Solo dentro de este período de tiempo está dado el intentar, por el cirujano, el transformar

mar la lesión abierta en cerrada. Proceder este que ha de beneficiar al herido, que de otro modo le amenaza el peligro de la integridad de su miembro, cuando no pierde la vida por gangrena gaseosa; infección temible en todos los traumatismos que interesan al tejido óseo.

El no proceder en esta forma, es poner fatalmente en peligro la vida de un semejante y, en los casos menos desfavorables, alargar enormemente el período de su curación. Curación que no siempre se logra con un miembro funcionalmente íntegro. Recordemos siempre el sabio postulado de Volkmann, "la primera cura decide la suerte del lesionado y la marcha ulterior de la herida".