



EVITEU LA FERIDURA

pel Dr. J. ALIBERCH

De tothom és coneguda la importància d'aquesta malaltia, terrible com poques, puig que frapa a l'home en l'edat que produeix més, materialment i espiritualment (40 a 50 anys). I si no arravata l'atacat en pocs dies, produeix el que pot anomenar-se la mort en vida, per allunyar-lo temporalment o definitivament de les seves activitats habituals (política, negocis, producció científica o literària) talment com un ésser inútil o invàlid. Si no tè mitjans de subsistència propis, ha de demanar l'ajut de la beneficència oficial, sempre avara amb aquests éssers dissortats, que en la seva plenitud li han ofert els millors fruits de la seva minerva, i per tenir a voltes la supervivència d'alguns anys no són admesos als hospitals, no quedant-los més remei que ingressar en un asil de vells on el nombre de places és limitadíssim, o implorar la caritat pública.

Catalunya paga cada any un fort tribut a aquesta malaltia; solament a Barcelona es calculen aproximadament 1.500 defuncions, a part d'un contingent deu vegades més gran d'invàlids que dona.

Encara que el coneixement vulgar d'aquest procés patològic data des de l'antiga Grècia i

Roma, els estudis científics son del segle passat, en el qual l'escola medical francesa de Fournier i Huchard, l'anglesa de Gull i Sullton continuada pels seus deixebles ha portat positius avenços; aquells introduïren en la nomenclatura científica el tema d'arterioesclerosi, que vol dir duresa de les artèries, essent deguda aquesta a un engruiximent de les mateixes a causa d'una transformació dels teixits de fibroelàstic en fibrós que comporta la pèrdua de la seva funció elàstica; essent la seva funció convertir el corrent sanguini, de discontinu, íntimament lligat als batecs cardíacs, en continu més apte per a l'adaptació funcional dels òrgans a les necessitats de cada instant.

Aquesta duresa es nota molt bé al tacte, en particular en les artèries superficials, temporal en els polsos, radial en el munyó, i pèdia en el peu, etc.; també de vegades es manifesta en la pantalla radiogràfica, puix que es marca en forma de tub. Aquest fenomen s'ha considerat com normalment en les persones velles per la tendència que tenen els teixits mésodèrmics a l'esclerosi o enduriment, però no s'ha d'admetre mai com a normal en els adults, ni en els joves. Les causes que s'invocaren com acceleradores o productores d'aquesta metaplasia o