

transformació de les parets de les artèries, son unes internes: l'edat crítica de la dona, les dis-cràssies acids, gota, reuma crònic, oxalúria, etcètera; la diabetis, l'albuminúria crònica, etc. esgotaments morals. Altres externes o exòge-nes: sífilis, alcoholisme, etc.; saturnisme, grans menjadors i bebedors, abusos sexuals, in-feccions repetides, crisis d'angoixa en borsistes, polítics, negociants, esgotaments intel·lectuals, etc., i altres vegades eren diverses les causes, influint l'herència com una predisposició a lo-calització vascular.

Després Hess exposa el concepte de la visco-sitat sanguínia com un dels components de l'a-tac d'hemiplègia, derivat del concepte antic de plètora, ja que la sang augmentava la seva tensió superficial a causa dels productes de des-integració que arrosseguen i obliguen a un gran esforç al cor i als vasos, per la seva adherència i àdhuc inventa un aparell per a la seva me-dició,

Von Basch, Riva Rocci observaren que en la major part dels malalts que tenien duresa arte-rial en les visibles o palpables, la sang estava a una pressió o tensió més augmentada que en els altres o normals; això es podia mesurar di-

rectament o indirectament per un mecanisme manomètric en centímetres de Hg., arribant per evolució d'aquest concepte a formar una malaltia anomenada hipertonia arterial sense relació amb processos renals, creient que és un transtorn endocrínic simpàtic, que obliga a una contracció permanent de les artèries petites i mitjanes contribuint a dita degeneració fibrosa, i abocant a la llarga a la seva ruptura princi-palment en l'esfera de les cerebrals, donant lloc al conegut atac o apoplegia amb les seves seqüeles d'hemiplègia, monoplègia, paraplègia segons s'afecti un membre o dos, quedant de fet inutilitzat, acompanyat o no de trastorns de la comprensió o exposició del llenguatge (afa-sia). En el seu estadi inicial d'hipertonia de les artèries, els símptomes o manifestacions dels malalts són molt poc marcats, puix que depèn de condicions individuals; algun rodament de cap lleuger, cansament de les cames, amb cert ofec a les caminades o pujades; d'aquí l'axioma que tota persona en arribar a la quarantena ha de fer-se mesurar pel metge la pressió per mit-jà dels aparells apropiats, puix que és la mane-rra de fer un tractament preventiu de la matei-xa a base de regimes moderats i eliminant les causes nocives que són els veritables resposna-bles. En casos més avançats, la cura diurètica, balneoteràpia, banys carbogaseosos, etc., et .

Aliments  
prohibits



Aliments  
permesos