

I FIMOSI

pel Dr. I. ORSOLA MARTÍ

ment amb la mucosa del «glande»; el «prepuci» pot tirar-se enrera, posant-se aleshores el glande al descobert i permetent-se així la neteja d'aquesta regió; és la neteja de la cavitat virtual que hi ha entre prepuci i glande i que s'anomena «cavitat balano-prepucial». Quan el «prepuci» té una longitud exagerada o bé una obertura massa estreta, l'individu portador d'aquesta disposició es diu que està afecte de «fimosi». El «fimosi» generalment és una anomalia d'origen congènit, però les ulceracions venèries, xancres i xancres sífilític, l'herpes i les inflamacions del glande i prepuci que es veuen sobretot en els individus diabètics poden produir una cicatriu que estreny l'obertura del prepuci i no permet tirar enrera el manegot prepucial; en aquests casos l'individu té un fimosi que és d'origen no congènit sino inflamatori.

La circumcisió ha de practicar-se en tots els individus portadors de fimosi, ja que aquesta mal formació és susceptible de produir una sèrie de trastorns alguns d'ells greus i que anem a exposar ara per a cloure aquest breu article de divulgació.

En les primeres edats de la vida un fimosi moltes vegades ignorat o que passa desapercbut pot ésser, com dèiem en un article anterior, la causa que el nen, tot i tenir quatre o cinc anys segueixi orinant-se al llit involuntàriament.

El fimosi no permet netejar adequadament el glande i la cavitat balano-prepucial que, estant humitejats continuament per l'orina i per les secrecions de les glàndules sebàcies d'aquesta regió, pel que es produeixen fàcilment infeccions anomenades «balanopostitis, més o menys molestes i que en casos extrems poden produir, per inflamació i congestió del meat i de la porció més externa del canó de l'orina, dificultats per la micció o bé la total impossibilitat d'orinar amb el dolor i la gravetat consegüents.

El fimosi amb les repetides i lleugeres infeccions de la regió a què predisposa i que produint coïssor desperten la necessitat de gratar pot ésser, i és molt sovint, el punt de partida d'hàbits solitaris en els nois.

Més endavant, i d'entrar en activitat les funcions sexuals, sovint el fimosi les dificultarà, impossibilitant o fent dolorosa l'erecció i exposant a l'estrangulament del glande o «parafimosi» que obliga a operar amb urgència i que pot produir abandonat a si mateix lesions gangrenals amb conseqüències irreparables.

El fimosi, a més, pel que dificulta la cura de la neteja de la regió predisposa en gran manera al contagi de les malalties venèries i a més representa també una predisposició al càncer del prepuci i del glande.



Tots els beneficis que s'obtinguin de la publicació d'aquest número, van destinats a engruixir la subscripció oberta pro secció sanitària del Sindicat Unic de Professions Liberals, secció de Publicitat.