

# LES "PAPERES". LLUR CONTAGI EN EL MEDI ESCOLAR \* Manera de prevenir-les

Les "paperes" es designen en termes mèdics amb el nom de "parotiditis epidèmica"; és una de les malalties més contagioses de les que acostumen a atacar els infants, i, a l'igual que moltes d'aquestes, és igualment immunitzant, és a dir, que una vegada soferta no es torna a passar.

*Quin és l'agent provocador?*—Per més que s'ha cercat, no s'ha pogut descobrir el microbi causant de la malaltia, no obstant saber-se amb certitud que es tracta d'un vertader agent microbià.

No entrem a descriure els signes perquè no és aquest el nostre objecte; passarem aleshores a indicar la font d'infecció.

*Quin és, doncs, el producte que duu el contagi?*—

S'està gairebé segur que el germen es transmet per mitjà de les secrecions de la boca i potser també per les del nas dels malalts, que, posant-se en contacte directe amb els sans, els contagia. Acció semblant també la poden fer les robes o objectes contaminats per l'ús dels malalts; en fi, com en altres malalties, els portadors de gèrmens—malalts guarits o persones que han estat en contacte amb aquells—també poden portar contagi.

*Quina és la duració del període d'incubació?*—Produït el contagi, la malaltia necessita, per a aparèixer, de dotze a vint-i-sis dies.

¿Quan comença un malalt a provocar contagi i durant quant temps és capaç d'infectar un sa que se li posi en contacte?

Pot dir-se amb certa probabilitat que des dels primers símptomes que experimenta un afectat de "paperes" és perillós, per portar contagi; aquesta aptitud contagiant dura fins que la inflor de la glàndula ha desaparegut per complet; d'una manera general direm que s'accepta que després de deu dies d'haver començat el mal ja cessa tot el poder de contagi.

*Altres dades útils.*—En general es tracta d'una afecció poc greu, que no té preferències per sexes i que es presenta en qualsevol estació de l'any.

Quines precaucions hem d'aconsellar per a evitar-la o prevenir-la?

Com en tota aquesta categoria de malalties, aïllar el més aviat possible el malalt. Desinfecció de locals i sobretot dels objectes contaminats per secrecions del malalt. Particularment en internats, separació entre atacat i sa, o millor, eliminació de malalts el més prompte que es pugui i fins i tot clausura de l'establiment, d'acord al terme més amunt establert per la transmissió de la malaltia.

