



# Per què es neixak

PeI Dr. CARLES CARCELLER

Es prou sabut de tothom que la durada d'un embaràs és aproximadament de nou mesos i que, perquè un nadó mereixi el nom de **madur**, cal que aconseguixi aquesta època d'evolució al si matern.

Si les coses no s'esdevenen així, succeeix que és portat al món un ésser, les condicions de vida del qual no són tan perfectes com correntment han d'ésser, i per això també tothom sap com és difícil que sobrevisqui un infant expulsat abans d'hora.

Donat, doncs, els perills que ofereix per al petit la seva sortida prematura, és lògic que sigui una tasca útil divulgar quines són les principals circumstàncies que poden donar lloc a un part al setè o vuitè mes d'embaràs, per tal de contribuir a combatre'n en el possible les causes. Descartem en aquest article les interrupcions espontànies de l'embaràs, que tenen lloc abans dels sis mesos i que s'anomenen avortaments. Ja ens vagarà algun altre dia d'ocupar-nos-en.

Una de les causes que dona més contingent d'infants nascuts abans d'hora és sense cap dubte la sífilis. Cal que ningú no ho ignori, puix d'aquesta guisa hom facilitarà molt la tasca del metge i, sobretot, no sera possible que matrimonis amb un legítim desig de tenir fills vegin interromputs tots els embarassos molt abans de terme. Aquesta malaltia molt més extensa del que sembla, de vegades, sobretot quan ve d'herència o l'ha sofert algun dels cònjuges amb un tractament insuficient, té la gracia de manifestar-se donant lloc a parts abans d'hora amb infants tarats que moren a les poques hores o a les poques setmanes. Per això, si hom es posa en cura pot aconseguir per a un altre embaràs que tot arribi a terme i que neixi un infant viu i en bones condicions per a l'esdevenidor.

Es clar que no sempre és degut el part prematur a aquesta causa i així altres vegades pot dependre del fet de patir la mare una de les anomenades intoxicacions de l'embaràs. Això passa en cas de sofrir tota una sèrie de molèsties que el metge considera d'aquesta mena i d'apreciar albúmina en l'orina, elevació de la pressió arterial i inflors a diverses parts del cos. Heus ací un altre perill seriós de part abans d'hora i que en la majoria de casos