

# POT TENIR FILLS LA DONA TUBERCULOSA?

**Pel Dr. J.  
REVENTÓS  
FARRARONS**

Heus aquí un problema que amb gran freqüència se ns presenta i que és d'una difícil i delicada solució.

Quantes vegades ha vingut al nostre despatx una malalta quin tractament ens ha estat encomanat i ens ha fet aquesta pregunta: ¿Dr., que em puc casar jo? Automàticament se ns presenta a la nostra ment un seguit de conflictes a quin més difícil i de més responsabilitat per a resoldre. Aquests, entre altres, són: El problema del contagi al marit, el problema sexual, el de l'embaràs, el del part, el de l'alletament, i el més pavorós de tots, el contagi al nou nat. Aquests són, podríem dir, els més transcendents problemes quina solució tractarem de donar.

Abans de tot cal pensar amb ella, doncs és ella qui ens fa la pregunta i ella és de la qui nosaltres som responsables. En pensar amb la malalta, pensarem amb la seva lesió, amb els seus pulmons, doncs encara que hi hagi, per desgràcia, moltes i variades formes i localitzacions de tuberculosi, s'ha de pensar que la persona que ens fa l'enquesta és una malalta de pit.

No és ací, crec jo, on s'ha de fer una classificació o copiar una de les nombroses classificacions que s'han fet sobre les diferents formes de la tuberculosi dels pulmons, i per tal és qüestió de pensar d'una manera diguem-ne popular, en la malalta, abans de contraure matrimoni i després d'ell.

¿Què és una malalta tuberculosa de pulmó?

Es una noia generalment prima, de mal color, de poc pes, poca gana, una certa tos, un xic d'expectoració, algunes dècimes a la caiguda de la tarda, fatiga al més lleuger esforç, alguna que altra vegada algun esput hemoptoic (amb sang).

Això és, fent un esquema, els símptomes exteriors més escandalosos del que és una malalta de pit.

Però nosaltres tenim a la nostra mà uns mitjans que ens faciliten un millor procediment per a arribar a un diagnòstic perfecte.

L'exploració clínica, el raig X, i el laboratori, són els nostres més fermes puntals d'exploració.

Tractaré ara de donar una idea del que trobem nosaltres un cop hem explorat una malalta de pit.

Podem, com ja he dit, trobar moltes i variades lesions; agafem-ne de totes elles una, i que sigui benigna. Figurem-nos una petita lesió que ocupi una determinada regió de pulmó. Una lesió tuberculosa de pulmó és una alteració del teixit pulmonar, ja sigui en forma d'invasió del teixit pulmonar, o en forma d'ulceració, i per tant, de pèrdua de substància (caverna) i això pot ésser de diferents tamanys segons la gravetat de la lesió.

¿Què passarà en cas que la dita malalta quedi embarassada?

Es en aquest moment que hem de recordar tot aquell seguit de reflexions que ens hem fet al principi d'aquest article.

**El contagi al marit:** Es evident que si una malalta contrau matrimoni sabent que està malalta, contrau una responsabilitat gravíssima, doncs la Tuberculosi és una malaltia extremadament contagiosa, i donat que el 99 % de matrimonis es verifiquen dels vint als vint-i-cinc anys, cal pensar que és aquesta la millor edat per a contagiar-se de la pitjor i més propagada de les malalties.

**El problema sexual:** Aquesta és una delicada part d'aquest tema, doncs tot matrimoni és el replà final d'una formosa escalinata quins esglaons són un seguit de promeses apassionades i esperades durant dies i dies, fins que s'arriba al feliç replà del matrimoni, però... en aquest replà sentada i de bracet de l'amor hi ha la **Tuberculosi**.

**El problema de l'embaràs:** Un tant per cent dels embarassos acostumen a anar acompanyats d'un seguit de trastorns, que si bé en una persona normal no tenen altra gravetat que la molèstia material que produeixen en una malalta aquests trastorns ajuden i col·laboren a fomentar el progrés de la malaltia.