

BARDANOL

Elixir antiestafilocóccico compuesto de Gel de Bardana y Estaño coloidal.

INDICACIONES:
Estafilococcias en general.



OBSERVACIÓN: Para pacientes glucosúricos, presérvase el **Bardanol para diabéticos**, sin azúcar y también de muy buen sabor.

Laboratorios A. GAMIR
Padre Jofré, núm. 9 - VALENCIA

Representante en Cataluña: M. RIPOLL
Plaza Letamendi, núm. 34 - Teléfono 11946
BARCELONA

PIPERACINA MIDY

El más rico en principio activo.

*Especificar bien el nombre MIDY
para evitar las substituciones*

Inhalación compuesta de los tres óxidos			
P	Piperacina	Sosa	c
F	Óxido Litio	Óxido Bario	d
12°	40	20	8

2 o 4 cucharadas de las de café por día.

Medicamento recomendado por el doctor Gamir, Madrid, París

Lecitina y Colesterina Wassermann

INJECTABLES DE 1, 2 y 5 CC.

OTRAS ESPECIALIDADES

VALERO - FOSFER WASSERMANN

LACTO - FOSFER WASSERMANN

DIARSEN - YODOS WASSERMANN

ATUSSOL WASSERMANN

YODOS WASSERMANN

GADIL WASSERMANN

ASPASMOL WASSERMANN

DISPONIBLE

BOROLUMYL

Único medicamento racional y científico para combatir la

EPILEPSIA

Estados convulsivos, clampsia, Manías, Parálisis, etc,

Medicación: Eficaz, inocua y de tolerancia

Para muestras y literatura dirigirse a
M. BENYETO - Apartado 648 - MADRID