

Inoculaciones con sangre sífilítica

(*Valler de Brague.*) La sangre sífilítica estaba en gran parte coagulada cuando la aplicó sobre las incisiones producidas por un escarificador.

Al cabo de tres días estas incisiones estaban cicatrizadas. Pero 34 días después de la inoculación dos tubérculos distintos aparecieron en aquel sitio y 32 días más tarde sobrevino una roseola confluyente.

(*Lindwurm.*) La inoculación fué hecha á una mujer de 71 años por medio de una inyección de sangre tomada de una mujer sífilítica en un sitio donde la piel estaba completamente sana. —4 semanas después de la inyección aparecieron en el punto picado, tubérculos rojizos: 8 días más tarde infartos de los ganglios escapulares; después roseola pápulo-escamoso.

La mujer que proporcionó la sangre sífilítica tenía 22 años y estaba embarazada de 8 meses: la sífilis con exantema pápulo-escamoso estaba al tercero ó cuarto mes de su evolución. El hijo de esta mujer, cinco días después de nacer fué atacado de pénfigo á la cara palmar de las manos y plantas de los pies, después de tubérculos en las nalgas y ano.

Murió al cabo de cinco meses, con varias de las lesiones propias de la sífilis hereditaria.

(*Gibert*) 40 días después de la inoculación al nivel de la puntura del antebrazo pápula rojiza, y á los quince días de ella sífilide escamosa.

Inoculaciones con líquido excretado por placas mucosas

(*Vallave.*)—Después de 28 días de incubación la herida de inoculación se transformó en chancro indurado típico: 47 días más tarde sífilide escamosa.

(*Vallace.*) Ablación del epidermis por medio de frotaciones y aplicación sobre este punto de líquido de una placa mucosa.

Otra inoculación parecida fué practicada en el mismo punto 12 días después de la primera: las dos con resultado positivo. Para la primera, la incubación fué de tres semanas y de 15 días para la segunda.—En cuanto á la de los accidentes secundarios duró cinco semanas.

(*Vallace.*) La inoculación fué hecha con la misma materia contagiosa que sirvió para la precedente.—La incubación del chancro fué poco menos de un mes y la segunda de 6 semanas.

(*Gibert.*) Sobre la superficie de un brazo escoriado por un vejigatorio, inoculación de la materia puriforme recogida de placas mucosas del ano.—Chancro á los 18 días; accidentes consecutivos á los 37 del primitivo.

(*Gibert.*) A los 25 días de la inoculación, chancro sífilítico; á los 37 roseola.