

(*Vallace.*)—Las heridas fueron hechas con un escarificador: los tubérculos chancrosos aparecieron al cabo de 35 días.—La segunda incubación fué de 27 días.

(*Guyeunot* en presencia de M. Rollet.)—Inoculaciones de pus de placas mucosas del ano, por medio de una lanceta. Chancro después de 28 días, siendo la incubación de 54.

(*Baereusprung*) Chancro enorme de la dimensión de una moneda de cinco pesetas sobrevenido después de 30 días de la inoculación.

(*Lindwurm.*) El chancro apareció después de tres semanas de incubación.—Inoculaciones con pus de sífilides pustulosas.

(*Vallace.*) Punturas sobre las cuales aplicó pus de pústulas sífilíticas de unos 15 días.—Al cabo de 29 días, chancro pápulo escamoso: la segunda incubación fué corta pues una erupción escamoso generalizada apareció á los 8 días del comienzo del chancro.

(*Vallace.*) El accidente primitivo, constituido por una ulceración extremadamente superficial apareció á los 28 días, la segunda incubación fué de 27 días.

(*Vidal.*) El enfermo que proporcionó el pus para la inoculación tenía sífilis solo de seis semanas de fecha, pero presentaba una erupción de pústulas —La inoculación de pus de una de ellas fué practicada sobre M. Boudeville, interno de farmacia.—Al cabo de 35 días de incubación se produjo un chancro infectante.—La incubación de los accidentes consecutivos fué de 4 meses y medio.

(*Rinecker.*) Inoculación de una sífilide pustulosa congénita: el pus fué sacado de pústulas de acné frontales de un niño sífilítico nacido de una madre sífilítica. Este pus fué aplicado sobre un vejigatorio en el brazo.—La primera incubación duró 23 días pasados los cuales apareció un chancro característico.

La segunda duró 130 días.—La sífilis consecutiva fué de las comunes.

Como vemos, á pesar de las diferentes procedencias del virus que ha servido de ensayo, (chancro, placas mucosas, sangre, pústulas), á pesar de los diversos procedimientos empleados para su trasmisión (vejigatorios, escoriaciones, inyecciones hipodérmicas, etc.) los resultados han sido siempre los mismos por lo que al chancro se refiere: primero, cicatrización completa de la herida ó puntura sin dejar ni vestigio de ella, á los dos ó tres días de practicada; segundo, período de calma absoluta durante el cual nada anormal ocurre (período de incubación cuyo promedio ha sido de 25 días); tercero, aparición del sífiloma constantemente en el sitio en donde se