

cer una sutura del borde derecho del epiploon con el peritoneo parietal, para constituir de este modo una cavidad independiente de la gran serosa, que puede servir como de bolsa para desagüe.

Estudió luego la *coledocostomía*, recordando que si bien Helferich y Kummel la practicaron los primeros, fué por equivocación diagnóstica, siendo Winikarter el que la practicó con deliberado propósito por primera vez. La coledocostomía requiere para ser ejecutada condiciones especiales que no se encuentran sino en limitadas ocasiones.

Pasó luego al estudio de la *coledoco-enterostomía*, que al igual que la operación anterior son técnicas excepcionales, y que por no ser practicables más que en determinadas condiciones anátomo patológicas, no pueden ser consideradas como operaciones regladas y definidas.

Al igual que la colecistolitotripsia, la *coledocolitotripsia* la cree injustificada, aun reconociendo la conveniencia, en algunos casos, de practicar moderadas presiones sobre el cálculo á través de las paredes sanas del colédoco, para ver de hacerle pasar á la cavidad del duodeno. Citó el caso de hepatotomía de Thomson, en el cual, después de abrir las vías biliares intra hepáticas, extrajo 420 cálculos, suturando á la piel los bordes de la herida hepática.

La *hepaticostomía*, dijo, no tiene más valor práctico que el que le suministra el caso operado por Kocher.

Estudió luego los accidentes y complicaciones que en estas operaciones se presentan, citando en primer término el no encontrar la vejiga biliar, por hallarse retraída y envuelta en tejido cicatricial; la caída de bilis ó pus en la gran cavidad es accidente que puede presentarse á menudo; en un caso perteneciente al disertante, practicó el drenaje con una bolsa de Mickulicz, por el hipogastrio; considera este proceder como de excepción; su enfermita (niña de 13 años) curó, pero la facilidad con que suceden eventraciones á los drenajes por el proceder de Mickulicz, hace que sea muy parco en aconsejarlo.



El  
puede  
A c  
sulas e  
y á 15  
de 6 á  
comida  
El  
trado e  
días de  
digesti  
que el

Cá  
tituyen  
Cá  
dos en  
ciones  
Cá  
reconst  
reál  
Cá  
Recons  
Cá  
vías res  
sis card  
Cá  
las ent  
—Frasc  
Cá  
letrugit  
clorosis  
de vien  
Cá  
ciones  
Cá  
nen las

Se  
macli  
farma