

aprisionar alguna asa intestinal, pero cree que cuando se interviene debe practicarse la extirpación de todo el trozo de recto prolapsado.

Pide la palabra el Dr. Martínez Vargas para rectificar: manifestó reconocimiento á los señores que le habían hecho objeciones, y se concretó á indicar su conformidad en que antes de intervenir quirúrgicamente en niños afectos de prolapso rectal, deben ensayarse los tratamientos higiénicos y terapéuticos pertinentes, pero si se presentan esfacelos, cree debe operarse inmediatamente.

Después de la rectificación del Dr. Vargas, cedió el Dr. Ribas y Perdigón la presidencia al Dr. Azcarreta, quien le concedió la palabra para continuar las objeciones al tema pendiente.

El Dr. Ribas, después de un rápido recuerdo de lo que había expuesto en la sesión anterior, continuó el estudio del color ó sea de la intensidad de la ictericia como indicación de la intervención operatoria en los afectos de las vías biliares, diciendo que aparte de los muchos casos en que hasta podía llegar á urgir la necesidad de proceder quirúrgicamente sin que existiese ictericia debía llamar la atención sobre el hecho de que en el terreno clínico no pocas veces lo que ha de inducir á operar es la disminución de la ictericia. Ocurre que en las obstrucciones coledoccos antiguos, por ejemplo, viene un momento en que las células hepáticas ya cansadas de la perniciosa labor que llevan á cabo é imposibilitadas de desembarazarse de sus productos de secreción, disminuye la cantidad de bilis segregada, y como se verifica la eliminación por órganos transitoriamente suplementarios, de aquí que al fin el tegumento y mucosas se decoloran, pero de una manera siniestra que no debe engañar al clínico experto. Entonces es cuando el clínico, gracias á este y otros síntomas que se presentan, debe aconsejar la intervención armada como único recurso racional. Por consiguiente, mientras la ictericia se manifieste, y más si va en aumento debe esperarse prudentemente á favor de los simples medios internos, para dar tiempo, en tanto no se ofrezcan otros fenómenos, que el médico debe descu-