

dese llegar también á la formación de fístulas, ora con la vena porta, ora con el intestino, el estómago, los riñones, el absceso subfrénico, etc.! ó se forman adherencias con el píloro, la cabeza del páncreas, englobando quizás los mismos conductos biliares, ahogándolos en una masa de tejido de inflamación crónica; y aun no resultando ninguna de estas y otras malas consecuencias de la infección biliar, puede ésta sordamente hacerse intrahepática y á la larga constituirse una suerte de hepatitis hipertrófica biliar análoga á la del tipo de Hanot.

Después de otras consideraciones en que procura el disertante hacer resaltar las ventajas de la intervención pronta; es decir, antes de que la litiasis se haya desenvuelto y engendrado lesiones consecutivas de alta gravedad, entra en el estudio del valor que los síntomas principales del proceso tienen como señal indicativa de la intervención.

Siguiendo el plan del Dr. Recasens dice que el *dolor* en sí puede á veces ser indicación. No lo es cuando es de poca intensidad y no se hermana con otros síntomas que exigen la operación. Hasta siendo intenso puede no demandarla si es pasajero, dócil á las medicaciones, evolucionando como en soledad morbosa, sin cuadro sindrómico, y sobre todo si del estudio minucioso del enfermo no emana la intervención por graves trastornos hepáticos (*urobilinuria, hipoasoturia é hipertoxia urmaria*). Si es intenso, durable, con *defensa abdominal*, poco ó nada modificable con buena medicación interna, es tanta la fuerza de su valor indicativo que, como dice Dujardin Beaumetz, si el médico no propone la intervención el enfermo la exige. Generalmente demuestra que hay supra infección biliar con movilización de los coledocos que en sus excursiones por los canales biliares inflama y necrosa sus epitelios y el tejido propio, pudiendo llegar á ulcerarlos y perforarlos.—(Terminó el tiempo reglamentario). Terminado el tiempo reglamentario el Dr. Torruella suspendió su discurso.

El Dr. Mas y Colom hizo dos ligeras observaciones al Dr. Margarit, respecto de que, es natural que el procedimiento del cateterismo del cístico practicado en ca-